

# Efectividad de olanzapina, quetiapina, risperidona y ziprasidona en pacientes con esquizofrenia crónica luego de la discontinuación de un antipsicótico atípico previo.

---

*Am J Psychiatry* 2006; 163(4):611-22

Stroup TS; Lieberman JA; McEvoy JP; Swartz MS; Davis SM; Rosenheck RA; Perkins DO; Keefe RS; Davis CE; Severe J; Hsiao JK;

Department of Psychiatry, University of North Carolina at Chapel Hill, CB# 7160, Chapel Hill, NC 27599-7160, USA.

## **ANTECEDENTES:**

En el tratamiento de la esquizofrenia, el reemplazo de antipsicóticos es habitual cuando un fármaco no es completamente efectivo, pero la efectividad relativa de las drogas usadas en esta estrategia es desconocida. Este estudio randomizado, a doble ciego comparó olanzapina, quetiapina, risperidona y ziprasidona en pacientes que habían discontinuado recientemente un tratamiento con un antipsicótico atípico.

## **METODOS:**

Los pacientes con esquizofrenia (N=444) que habían discontinuado un tratamiento con antipsicóticos atípicos asignados en forma randomizada durante la fase 1 del estudio CATIE (Clinical Antipsychotic Trials of Intervention Effectiveness) fueron reasignados en forma randomizada a un tratamiento doble ciego con un antipsicótico diferente (olanzapina 7.5-30 mg/día [N=66]; quetiapina, 200-800 mg/día [N=63]; risperidona, 1.5-6.0 mg/día [N=69]; o ziprasidona, 40-160 mg/día [N=135]). El principal objetivo fue determinar si había diferencias en efectividad entre estos cuatro tratamientos, medida por el tiempo hasta la discontinuación por alguna razón.

## **RESULTADOS:**

El tiempo hasta la discontinuación del tratamiento fue mayor para pacientes tratados con risperidona (mediana: 7.0 meses) y olanzapina (6.3 meses) en comparación con quetiapina (4.0 meses) y ziprasidona (2.8 meses). Entre los pacientes que discontinuaron su antipsicótico previo debido a ineficacia (N=184), la olanzapina fue más efectiva que la quetiapina y la ziprasidona, y la risperidona fue más efectiva que la quetiapina. No hubo diferencias significativas entre antipsicóticos en aquellos que discontinuaron sus tratamientos previos debido a intolerancia (N=168).

## **CONCLUSIONES:**

Entre el grupo de pacientes con esquizofrenia crónica que había discontinuado recientemente el tratamiento con un antipsicótico atípico, la risperidona y la olanzapina fueron más efectivas que la quetiapina y la ziprasidona como queda reflejado por un mayor tiempo de permanencia en el tratamiento hasta la discontinuación por cualquier razón.

---