

Eficacia y seguridad a largo plazo de la risperidona en adultos con trastorno de comportamiento disruptivo

Psychopharmacology (Berl). 2005; 179(3):629-36

Gagliano C; Read S; Thorpe L; Eerdeken M; Van Hove I

Westdene Research Center, PO Box 29788, Danhof, 9310, South Africa.

ANTECEDENTES:

El funcionamiento de los adultos en la sociedad puede ser afectado en forma severa por comportamientos disruptivos.

OBJETIVOS:

Investigar la eficacia y la seguridad de la risperidona en el tratamiento del trastorno del comportamiento disruptivo en adultos con trastornos intelectuales.

MÉTODOS:

Los adultos con trastornos intelectuales y del comportamiento disruptivo fueron asignados en forma aleatoria a recibir risperidona (n=39) en un régimen de dosis flexible entre 1 y 4 mg/día (dosis promedio, 1,45 +/- 0,08 mg/día) o placebo (n= 38) durante cuatro semanas en un tratamiento doble ciego. Las medidas de eficacia primarias se midieron utilizando el Listado de Comportamiento Aberrante (ABC, por sus siglas en inglés). Las medidas de eficacia secundarias incluyeron el Listado de Problemas de Comportamiento y las Escalas de Impresión Clínica Global. Luego de este período de cuatro semanas, los pacientes podían ingresar a una fase abierta de este estudio por cuarenta y ocho semanas más.

RESULTADOS:

La risperidona presentó una buena tolerabilidad. Los pacientes tratados con risperidona mostraron una mejoría significativa en la evaluación final en el listado ABC, que aquellos que recibieron placebo; [-27,3 puntos (52,8% de mejoría) versus -14,9 puntos (31,3% d mejoría); P = 0,036] y también hubo mejorías en las medidas de eficacia secundarias. Durante el período de seguimiento del tratamiento abierto de cuarenta y ocho semanas, se produjo una mayor disminución de 6,3 puntos (P < 0,05) sobre el listado ABC para aquellos pacientes que recibieron risperidona en las cuatro semanas previas y una disminución de 11,3 puntos (P < 0,05) para los pacientes que inicialmente recibieron placebo y fueron cambiados al estudio abierto con risperidona en la semana cinco. Estos resultados se lograron con una dosis promedio de 1,8 mg/día.

CONCLUSION:

La risperidona es eficaz y bien tolerada en el manejo de los trastornos del comportamiento disruptivo en adultos con trastornos intelectuales.
